

附件 2 略

附件 3 略

附件 4

## 说明书和标签

### 一、注射用盐酸替来他明盐酸唑拉西洋说明书和标签

#### (一) 注射用盐酸替来他明盐酸唑拉西洋说明书

兽用麻醉药品

兽用处方药

#### 【兽药名称】

通用名称：注射用盐酸替来他明盐酸唑拉西洋

商品名称：舒泰<sup>®</sup>50、舒泰<sup>®</sup>100 (Zoletil<sup>®</sup> 50, Zoletil<sup>®</sup> 100)

英文名称：Tiletamine Hydrochloride and Zolazepam Hydrochloride for Injection

汉语拼音：Zhusheyong Yansuan Tilaitaming Yansuan Zuolaxipan

【主要成分】 盐酸替来他明、盐酸唑拉西洋

【性状】 本品为白色至淡黄色结晶性冻干粉末。

【药理作用】 **药效学** 本品为复方麻醉剂。盐酸替来他明和盐酸唑拉西洋的作用机制可以互相补充。替来他明是一种分离麻醉剂，其药理作用与氯胺酮类似；唑拉西洋为苯二氮草类镇静催眠药，药理作用与安定类似，具有抗焦虑、镇静、抗惊厥和肌肉松弛作用。唑拉西洋可加强替来他明对中枢神经系统的抑制作用，同时又可防止由替来他明引起的惊厥，增强肌肉松弛效果，还可缩短麻醉苏醒时间。本品能迅速使肌肉松弛，引起浅表性痛觉和内脏的痛觉消失，并且不引起呼吸中枢抑制。具有镇静、镇痛和麻醉作用。

**药动学** 犬、猫肌肉注射 10mg/kg 体重后，替来他明和唑拉西洋的血药浓度 30 分钟内达到高峰。麻醉持续时间为 20~60 分钟。替来他明的半衰期：犬为 75 分钟，猫为 150 分钟；唑拉西洋的半衰期：犬为 60 分钟，猫为 270 分钟。

**药物相互作用** 1.与酚噻嗪（乙酰丙嗪、氯丙嗪）合用，可增加心脏抑制、呼吸功能抑制和体温降低的风险。

2.氯霉素会降低麻醉药的代谢率。

【适应证】 用于犬、猫的保定和全身麻醉。

【用法与用量】 使用前用包装内无菌注射用水溶解固体瓶内粉末。

术前用药：在注射本品 15 分钟前使用硫酸阿托品，皮下注射：每 1kg 体重，犬 0.1mg，猫 0.05mg。

全身麻醉：首次剂量，肌肉注射：每 1kg 体重，犬 7~25mg，猫 10~15mg。或静脉注射：每 1kg 体重，犬 5~10mg，猫 5~7.5mg。

维持剂量：为首次剂量的 1/3~1/2，最好采用静脉注射。

【不良反应】 与其他麻醉药一样，使用中可能出现的不良反应与动物个体的健康状况、年龄、给药剂量和持续时间有关。可能出现的不良反应包括：

1.诱导综合征：如心肺衰竭、气管分泌物增加、呕吐等。

2.麻醉后综合征：如苏醒时间延长、体温调节障碍、胃扩张等。

3.过敏反应。

【禁忌症】 1.接受系统性有机磷氨基甲酸酯类杀虫治疗的犬猫。

- 2.患有严重心脏病或呼吸系统缺陷的犬猫。
- 3.胰腺缺陷的动物。
- 4.患有严重高血压的犬猫。

**【注意事项】** 1.在兽医指导下使用。

- 2.实施麻醉前禁食 12 小时。
- 3.确保犬猫在安静和凉暗的环境下苏醒。
- 4.注意犬猫保温，防止热量散失过多。
- 5.本品稀释后，室温避光保存 48 小时或 2~8℃避光保存 8 日。

**【规格】** (1) 替来他明 125mg+唑拉西洋 125mg (2) 替来他明 250mg+唑拉西洋 250mg

**【贮藏】** 遮光，密闭保存。

**【有效期】** 24 个月

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 法国维克有限公司 (VIRBAC)

地址：1 ERE AVENUE 2065 M LID, 06510 CARROS, FRANCE

## (二) 注射用盐酸替来他明盐酸唑拉西洋标签

**兽用麻醉药品**

**兽用处方药**

**【兽药名称】**

通用名称：注射用盐酸替来他明盐酸唑拉西洋

商品名称：舒泰®50、舒泰®100 (Zoletil® 50, Zoletil® 100)

英文名称：Tiletamine Hydrochloride and Zolazepam Hydrochloride for Injection

汉语拼音：Zhusheyong Yansuan Tilaitaming Yansuan Zuolaxipan

**【主要成分】** 盐酸替来他明、盐酸唑拉西洋

**【性状】** 本品为白色至淡黄色结晶性冻干粉末。

**【适应证】** 用于犬、猫的保定和全身麻醉。

**【用法与用量】** 使用前用包装内无菌注射用水溶解固体瓶内粉末。(详见说明书)。

**【规格】** (1) 替来他明 125mg+唑拉西洋 125mg (2) 替来他明 250mg+唑拉西洋 250mg

**【进口兽药注册证号】**

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【有效期】** 至

**【贮藏】** 遮光，密闭保存。

**【生产企业】** 法国维克有限公司 (VIRBAC)

地址：1 ERE AVENUE 2065 M LID, 06510 CARROS, FRANCE

## 二、复方季铵盐戊二醛溶液说明书和标签

### (一) 复方季铵盐戊二醛溶液说明书

**兽用 外用**

**【兽药名称】**

通用名称：复方季铵盐戊二醛溶液

商品名称：裴赛斯（VIROCID®）

英文名称：Compound Quaternary Ammonium Salts and Glutaral Solution

汉语拼音：FuFang Ji'anyan Wu'erquan Rongye

**【主要成分】** 二癸基二甲基氯化铵、烷基二甲基苄基氯化铵和戊二醛

**【性状】** 本品为棕色澄清液体。

**【药理作用】** 双链季铵盐为阳离子表面活性剂，具有亲脂性，可溶解细菌细胞壁、细胞膜及病毒的囊膜，导致生物膜的渗透性改变及组分外流。戊二醛具有亲水性，可与病毒的衣壳蛋白及微生物的酶结合，使蛋白凝固；戊二醛还可以与微生物的核酸结合，使核酸变性而杀灭微生物。在亲脂消毒剂季铵盐的协助下，戊二醛能进入微生物细胞内快速发挥效力。

**【用途】** 用于牧场及畜禽栏舍的日常环境消毒。

**【用法与用量】** 以本品计。浸泡或喷雾：用于病毒消毒时，以 1：200 稀释；用于细菌、真菌、霉菌和酵母菌消毒时，以 1：400 稀释；用于农场入口消毒池消毒时，以 1：200 稀释，应参考农场的日常消毒程序，并根据消毒池人员及车辆等进出的频率和清洁程度，建议每 2~3 日更换一次消毒液。

**【不良反应】** 按推荐剂量使用，未见不良反应。

**【注意事项】** 1.避免意外吞食。

2.避免眼睛或皮肤接触消毒液，当使用消毒液时要穿戴防护服，如手套、面具和护目镜等。皮肤或眼睛不慎接触到消毒液，要立刻用清水冲洗。

3.本品为环境消毒剂，勿用于食品动物体表或带畜消毒。

4.本品对水生生物有毒，禁止向下水道排放或者向环境直接排放。

**【休药期】** 无需制定

**【规格】** 1000ml：烷基二甲基苄基氯化铵 170.6g+二癸基二甲基氯化铵 78.0g+戊二醛 107.25g

**【包装】** 1L、5L、10L、20L

**【贮藏】** 密封，阴凉处保存。

**【有效期】** 36 个月

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 世德来有限公司（CID LINES N.V.）

地址：Waterpoorstraat 2, Ieper, West-Vlaanderen, B-8900, Belgium

## （二）复方季铵盐戊二醛溶液标签

**兽用 外用**

**【兽药名称】**

通用名称：复方季铵盐戊二醛溶液

商品名称：裴赛斯（VIROCID®）

英文名称：Compound Quaternary Ammonium Salts and Glutaral Solution

汉语拼音：FuFang Ji'anyan Wu'erquan Rongye

**【主要成分】** 二癸基二甲基氯化铵、烷基二甲基苄基氯化铵和戊二醛

**【性状】** 本品为棕色澄清液体。

**【用途】** 用于牧场及畜禽栏舍的日常环境消毒。

**【用法与用量】** 以本品计。浸泡或喷雾：用于病毒消毒时，以 1：200 稀释；用于细菌、真菌、霉菌和酵母菌消毒时，以 1：400 稀释；用于农场入口消毒池消毒时，以 1：200 稀释，

应参考农场的日常消毒程序，并根据消毒池人员及车辆等进出的频率和清洁程度，建议每2~3日更换一次消毒液。

**【规格】** 1000ml：烷基二甲基苄基氯化铵 170.6g+二癸基二甲基氯化铵 78.0g+戊二醛 107.25g

**【进口兽药注册证号】**

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【有效期】** 至

**【休药期】** 无需制定

**【贮藏】** 密封，阴凉处保存。

**【包装】** 1L、5L、10L、20L

**【生产企业】** 世德来有限公司（CID LINES N.V.）

地址：Waterpoorstraat 2, Ieper, West-Vlaanderen, B-8900, Belgium

### 三、犬细小病毒病活疫苗（NL-35-D 株）说明书和标签

#### （一）犬细小病毒病活疫苗（NL-35-D 株）说明书

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名称：犬细小病毒病活疫苗（NL-35-D 株）

商品名称：卫佳®细

英文名称：Parvovirus Vaccine, Live (Strain NL-35-D)

汉语拼音：Quan Xiaobingdubing Huoyimiao (NL-35-D Zhu)

**【主要成分与含量】** 含犬细小病毒 NL-35-D 株至少  $10^{7.0}$ TCID<sub>50</sub>/头份。

**【性状】** 微黄色至粉色澄明液体。

**【作用与用途】** 用于预防犬细小病毒引起的肠炎。

**【用法与用量】** 皮下或肌肉注射，每次1头份（1ml）。推荐首次对6周龄或6周龄以上犬连续接种3次，每次间隔3周，以后每年接种1次。

**【不良反应】** 接种疫苗后，个别犬可能出现过敏反应，此时，可用肾上腺素进行抢救，并采取适当的辅助治疗措施。

**【注意事项】** 1.仅用于接种健康犬，禁止接种怀孕母犬。

2.疫苗不得冻结或长时间暴露在高温下或阳光直射。

3.使用前应充分摇匀。

4.疫苗瓶启封后，应一次用完。

5.接种时，应按常规无菌操作；注射器和针头不能使用化学方法消毒。

6.疫苗内含有庆大霉素和硫柳汞。

7.用过的疫苗瓶和未用完的疫苗应焚毁。

8.如果动物处于某些传染性疾病的潜伏期、营养不良、有寄生虫感染、处于运输或环境应激状态下或存在免疫抑制，或者未按说明书进行接种，均可能引起免疫失败。

**【规格】** （1）1头份（1ml）/瓶 （2）10头份（10ml）/瓶

**【包装】** （1）50×1头份（1ml）瓶/盒 （2）5×10头份（10ml）瓶/盒

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为18个月。

**【《进口兽药注册证书》证号】**

**【生产企业】** 硕腾公司美国林肯厂（Zoetis Inc., Lincoln, USA）

地址：601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska, 68521, USA

**仅在兽医指导下使用**

**（二）犬细小病毒病活疫苗（NL-35-D 株）标签**

**兽用**

**卫佳®细**

**犬细小病毒病活疫苗（NL-35-D 株）**

1（10）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

生产日期：

**【用法与用量】** 皮下或肌肉注射，每次 1 头份（1ml）。首次接种对 6 周龄或 6 周龄以上犬连续接种 3 次，每次间隔 3 周，以后每年接种 1 次。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 18 个月。

**【生产企业】** 硕腾公司美国林肯厂（Zoetis Inc., Lincoln, USA）

**仅在兽医指导下使用**

**四、鸡马立克氏病 I 型、III 型二价活疫苗（CVI988 株+FC-126 株）**

**说明书和标签**

**（一）鸡马立克氏病 I 型、III 型二价活疫苗（CVI988 株+FC-126 株）说明书**

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名称：鸡马立克氏病 I 型、III 型二价活疫苗（CVI988 株+FC-126 株）

商品名称：双力宝®

英文名称：Marek's Disease Vaccine Serotypes 1&3, Live Virus

汉语拼音：Ji Malikeshibing I Xing、III Xing Erjia Huoyimiao（CVI988 Zhu+FC-126 Zhu）

**【主要成分与含量】** 每羽份疫苗中含有鸡马立克氏病病毒 CVI988 株至少 1500PFU，含有 FC-126 株至少 1500PFU。

**【性状】** 类白色至粉色细胞悬液。

**【作用与用途】** 用于预防鸡马立克氏病。

**【用法与用量】** 1 日龄雏鸡皮下注射。按瓶签注明的羽份，每 1000 羽份疫苗用 200ml 无菌稀释液稀释。用 22~20 号针头的全自动注射器接种，每只雏鸡 0.2ml（含 1 羽份）。

**【不良反应】** 一般无可见的不良反应。

**【注意事项】** 1.仅用于接种 1 日龄健康雏鸡。

2.接种疫苗后避免雏鸡过早暴露于易于感染马立克氏病的环境中，使雏鸡能够产生保护性抗体。

3.将疫苗瓶放入装有一半体积 27℃的清水中快速解冻。

4.免疫接种时，稀释好的疫苗，温度在 21~27℃。如果温度不能低于 27℃，将稀释好

的疫苗瓶置于冰浴中。

5.保证注射器无菌，接种时需经常更换针头。

6.疫苗于稀释后 2 小时内用完。

7.疫苗中含有庆大霉素。

8.不建议该疫苗与其它生物制品混合使用。

9.屠宰前 21 日内禁止使用。

10.用过的疫苗瓶、用具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

11.对使用者应采取必要的预防措施，包括使用手套，面罩和护目镜，避免处理液氮时可能带来的危害，避免从液氮冰箱，液氮罐或提桶中取出的玻璃瓶在置于容器内解冻时可能爆裂带来的危害。从提筒中取出疫苗瓶时，戴手套的手掌应远离面部和身体其他部位。

**【规格】** (1) 1000 羽份/瓶 (2) 2000 羽份/瓶

**【贮藏与有效期】** 液氮中保存，有效期为 22 个月。

**【《进口兽药注册证书》证号】**

**【生产企业】** 硕腾公司美国查理斯堡生产厂 (Zoetis Inc.,Charles City,USA)

地址 2000 Rockford Road, Charles City, 50616-9989, Iowa, USA

**仅在兽医指导下使用**

## (二) 鸡马立克氏病 I 型、III 型二价活疫苗 (CVI988 株+FC-126 株) 标签

**兽用**

**双力宝®**

**鸡马立克氏病 I 型、III 型二价活疫苗 (CVI988 株+FC-126 株)**

1000 (2000) 羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

生产日期:

有效期至:

详见说明书。

**【生产企业】** 硕腾公司美国查理斯堡生产厂 (Zoetis Inc.,Charles City,USA)

**仅在兽医指导下使用**

## 五、土霉素注射液说明书和标签

### (一) 土霉素注射液说明书

**兽用处方药**

**【兽药名称】**

通用名称: 土霉素注射液

商品名称: 百福他

英文名称: Oxytetracycline Injection

汉语拼音: Tumeisu Zhusheye

**【主要成分】** 土霉素

**【性状】** 本品为黄色至棕黄色澄明液体。

**【药理作用】** 四环素类抗菌药。具有广谱抗菌作用，对革兰氏阳性、阴性细菌，支原体，钩端螺旋体，立克次氏体及衣原体有效。肌内注射或皮下注射本品约2~6小时血药浓度达高峰，其有效血药浓度至少可持续4日。土霉素分布到全身，并几乎不发生降解。肌内注射后猪体内半衰期约为10小时，牛体内半衰期约为20~34小时；皮下注射后牛体内半衰期约为15小时。土霉素主要通过尿及胆汁排泄。

**【适应证】** 用于治疗肉牛和猪由敏感的革兰氏阳性、阴性细菌、支原体、钩端螺旋体、立克次氏体及衣原体引起的感染。

**【用法与用量】** 以土霉素计。肌内或皮下注射：一次量，每1kg体重，肉牛10~20mg，每个注射部位不超过10ml（小牛每个注射部位应为1~2ml）。肌内注射：一次量，每1kg体重，猪10~20mg，每个注射部位不超过5ml。

**【不良反应】** 个别动物可能发生土霉素过敏反应。

**【注意事项】** 1.泌乳期奶牛不得使用。

2.避免与青霉素同时使用。

3.不得冷冻；15℃以下产品可产生絮状物，请缓慢升温使其变澄清后使用。

4.请在兽医指导下使用。

5.不得让儿童接触到本品。

**【休药期】** 肉牛、猪28日。

**【规格】** (1) 100ml : 20g (2) 250ml : 50g (3) 500ml : 100g

**【包装】**

**【贮藏】** 15~25℃保存。

**【有效期】** 36个月。

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** TriRx Shawnee 责任有限公司 (TriRx Shawnee, LLC)

地址：12707 Shawnee Mission Parkway, Shawnee Mission, Kansas 66216-1846, USA

## (二) 土霉素注射液标签

**兽用处方药**

**【兽药名称】**

通用名称：土霉素注射液

商品名称：百福他

英文名称：Oxytetracycline Injection

汉语拼音：Tumeisu Zhushuye

**【主要成分】** 土霉素

**【性状】** 本品为黄色至棕黄色澄明液体。

**【适应证】** 用于治疗肉牛和猪由敏感的革兰氏阳性、阴性细菌、支原体、钩端螺旋体、立克次氏体及衣原体引起的感染。

**【用法与用量】** 以土霉素计。肌内或皮下注射：一次量，每1kg体重，肉牛10~20mg，每个注射部位不超过10ml（小牛每个注射部位应为1~2ml）。肌内注射：一次量，每1kg体重，猪10~20mg，每个注射部位不超过5ml。

**【规格】** (1) 100ml : 20g (2) 250ml : 50g (3) 500ml : 100g

**【进口兽药注册证号】**

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【有效期】** 至

**【休药期】** 肉牛、猪 28 日。

**【贮藏】** 15~25℃ 保存。

**【包装】** (1) 100ml/瓶×12 瓶/盒 (2) 250ml/瓶×12 瓶/盒 (3) 500ml/瓶×6 瓶/盒

**【生产企业】** TriRx Shawnee 责任有限公司 (TriRx Shawnee, LLC)

地址: 12707 Shawnee Mission Parkway, Shawnee Mission, Kansas 66216-1846, USA

## 六、碘混合溶液说明书和标签 (二合一)

**兽用 外用**

**【兽药名称】**

通用名称: 碘混合溶液

商品名称: 利乳膜 (Blockade)

英文名称: Iodine Mixed Solution

汉语拼音: Dian Hunhe Rongye

**【主要成分】** 碘

**【性状】** 本品为黑褐色液体; 黏稠, 具有碘的特臭。

**【药理作用】** 本品主要成分是碘。碘具有强大的杀菌作用, 其原理是碘化和氧化菌体蛋白的活性基团, 并与蛋白的氨基酸结合而导致蛋白变性或抑制菌体的代谢酶系统。本品对引起乳房炎的病原体如金黄色葡萄球菌、无乳链球菌等有较强的杀灭作用。本品可在乳头表面形成一层保护膜, 杀菌并保护乳头, 有效防止皮肤粗糙、皲裂, 适于环境卫生较差、泥泞、多雨等条件, 有助于预防奶牛乳房炎病原微生物的感染。

**【适应证】** 用于泌乳期奶牛的乳头消毒。

**【用法与用量】** 外用。挤完奶后, 立即用本品药浴每个乳头, 确保药液覆盖四分之三的乳头。每次使用后清洁药浴杯。

**【不良反应】** 按推荐的用法与用量使用, 未见不良反应。

**【注意事项】** 1. 仅限外用。

2. 禁与其它化学物质混合使用。

3. 避免接触人的眼睛, 一旦溅入眼睛应立即用大量清水冲洗, 必要时咨询医生。

4. 如果不慎吞食本品, 应立即饮用大量清水, 并尽快就医。

5. 对碘过敏者操作时应穿戴手套和防护面具。

6. 置于儿童不可触及处。

7. 开封使用后应用原容器贮存并将盖拧紧。

8. 如果产品冻结, 使用前应置于室温解冻并充分摇匀。

9. 气候寒冷有风时, 药浴后, 待乳头干燥后再释放奶牛。

**【弃奶期】** 无需制定。

**【规格】** 0.25%

**【包装】**



**【贮藏】** 遮光、密封，低于 30℃ 保存。

**【有效期】** 12 个月。

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 利拉伐 N.V.公司 (DeLaval N.V.)

地址: Industriepark-Drongen 10, Gent ,9031, Belgium

## 七、碘甘油混合溶液说明书和标签（二合一）

**兽用 外用**

**【兽药名称】**

通用名称: 碘甘油混合溶液

商品名称: 滴宝 (Dipal Conc.)

英文名称: Iodine and Glycerol Mixed Solution

汉语拼音: Dian Ganyou Hunhe Rongye

**【主要成分】** 碘

**【性状】** 本品为黑褐色液体。

**【药理作用】** 消毒防腐药。本品主要成分为碘。碘具有强大的杀菌作用，其原理是碘化和氧化菌体蛋白的活性基团，并与蛋白的氨基酸结合而导致蛋白变性或抑制菌体的代谢酶系统。本品对引起乳房炎的病原体如金黄色葡萄球菌、无乳链球菌等有较强的杀灭作用。本品中含甘油、山梨醇等成分，可防止皮肤粗糙或在干燥等特殊环境中保护皮肤，有效预防奶牛乳房炎。

**【用途】** 用于泌乳期奶牛的乳头消毒，预防泌乳期奶牛的乳房炎。

**【用法与用量】** 外用。按 1:4 的比例用水稀释本品。挤完奶后，立即用稀释液药浴每个乳头，或对每个乳头进行充分喷雾消毒，确保稀释液覆盖四分之三的乳头。

**【不良反应】** 按推荐的用法与用量使用，未见不良反应。

**【注意事项】** 1.仅限于外用。

2.勿与其他化学物质混合。

3.气候寒冷有风时，药浴后等待 30 秒或待乳头干燥后，用纸巾吸干乳头上的水分再放开奶牛。

4.避免与眼睛接触。如不慎接触，应立即用大量清水冲洗，必要时就诊。

5.如果不慎吞食本品，应立即饮用大量清水并就诊。

6.对碘过敏的人操作时应戴手套和防护面具。

7.置于儿童无法触及处。

8.开封使用后应在原容器贮存并注意将盖拧紧。

9.如果产品冻结，使用前应放在温暖的室内解冻，充分摇匀。

**【休药期】** 无需制定。

**【包装】**

**【规格】** 0.75% (g/g)

**【贮藏】** 遮光，阴凉处保存。

**【有效期】** 12 个月。

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 利拉伐N.V.公司 (Delaval N.V.)

地址: Industriepark-Drongen 10, B-9031 Gent, Belgium

## 八、猪支原体肺炎灭活疫苗 (J 株) 说明书和标签

### (一) 猪支原体肺炎灭活疫苗 (J 株) 说明书

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名称: 猪支原体肺炎灭活疫苗 (J 株)

商品名称: 喜宜丰

英文名称: Swine Mycoplasma Hyopneumoniae Vaccine, Inactivated (Strain J)

汉语拼音: Zhu Zhiyuantifeiyan Miehuoyimiao (J Zhu)

**【主要成分与含量】** 含灭活的猪肺炎支原体, 灭活前至少为 50AMU/头份。

**【性状】** 略带粉红色的均匀悬液。

**【作用与用途】** 用于预防猪支原体肺炎。

**【用法与用量】** 颈部肌肉注射。7 日龄以上的所有年龄、体重和性别的猪均接种疫苗 2ml (含 1 头份)。

地方性肺炎高发率的农场 7~10 日龄接种疫苗 2ml (含 1 头份), 15~21 日后进行第二次免疫。

地方性肺炎低发率的农场 在 5 周龄时接种疫苗 2ml (含 1 头份)。

**【不良反应】** 个别猪接种后可能会发生过敏, 应立即使用抗组胺药脱敏治疗。

**【注意事项】** 1. 仅用于接种健康猪。

2. 注射前应将疫苗恢复至室温。

3. 疫苗应避光保存, 切勿冻结。

4. 使用前应充分摇匀。

5. 使用过的疫苗瓶器具或未用完的疫苗应进行无害化处理。

**【规格】** (1) 10 头份/瓶 (2) 50 头份/瓶 (3) 125 头份/瓶 (4) 250 头份/瓶

**【包装】** (1) 1 瓶/盒 (2) 10 瓶/盒

**【贮藏与有效期】** 2~8℃ 保存, 有效期为 18 个月。

**【《进口兽药注册证书》证号】**

**【生产企业】** 西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona), Spain

**仅在兽医指导下使用**

### (二) 猪支原体肺炎灭活疫苗 (J 株) 标签

**喜宜丰**

**猪支原体肺炎灭活疫苗 (J 株)**

**兽用**

10（50、125、250）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

**【作用与用途】** 用于预防猪支原体肺炎。

**【用法与用量】** 颈部肌肉注射。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为18个月。

**【生产企业】** 西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona), Spain

**仅在兽医指导下使用**